

_____ التاريخ

حضرة ولي أمر الطالب/ة
تحية وبعد،

نشرة لأولياء الأمور قبل إعطاء تطعيم ضد الإنفلونزا דף מידע להורים לפני מתן חיסון שפעת

نود إعلامكم أن في هذه السنة سيعطى لابنكم/ابنتكم تطعماً ضد الإنفلونزا. يقلل التطعيم احتمال الإصابة بالمرض وبمضاعفاته. يُعطى التطعيم بحقنة واحدة في الذراع.

عليكم إخبار ممرضة المدرسة في الحالات التالية:

- إذا كانت حرارة الطالب/ة مرتفعة يوم إعطاء التطعيم. في هذه الحالة قد توجب الممرضة إعطاء التطعيم إلى حين عودة الحرارة إلى معدلها الطبيعي.
- إذا أصيب الطالب/ة برودة فعل قوية بعد إعطائه تطعيم الإنفلونزا في السابق.
- إذا أصيب الطالب/ة برودة فعل حساسية قوية من نوع "أنافيلاكسي" بسبب طعام , دواء , تطعيم أو مطاط (لاتيكس)
- إذا تلقى الطالب/ة تطعماً ضد الإنفلونزا خلال السنة الدراسية الحالية .
لهذه المعلومات أهمية كبيرة في اتخاذ القرار بإعطاء التطعيم.

قد يصاب بعض الطلاب بأعراض جانبية بعد تلقي التطعيم، والتي تكون عادة طفيفة وعابرة:
الأعراض الموضعية: ظهور احمرار أو انتفاخ في مكان إعطاء الإبرة والتي تستمر يوماً أو يومين.
الأعراض العامة: حرارة مرتفعة، بحّة بالصوت , سعال , تهيج في العينين, ألم في العضلات , صداع في الرأس , حكة واعياء والتي يمكن ان تستمرّ يوماً أو يومين.

هنالك أعراض نادرة للغاية وهي رد فعل تحسّسي من نوع "انافيلكسي" والذي قد يكون سريعاً وحاداً.

للأطفال دون جيل 9 سنوات الذين لم يتلقوا حتى اليوم جرعتين على الأقل من التطعيم ضد الإنفلونزا، يجب استكمال الجرعة الثانية من التطعيم ضد الإنفلونزا في صندوق المرضى (كوبات حوليم)، 4 أسابيع على الأقل من زمن إعطاء الجرعة الأولى. من الممكن استكمال الجرعة الثانية بأي تطعيم متوفر ضد الإنفلونزا

موعد اعطاء التطعيم _____.

الرجاء إرسال دفتر التطعيمات الخاص بابنكم/ابنتكم إلى المدرسة حتى تاريخ _____.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع وزارة الصحة

<http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/flu/Pages/default.aspx>

شكراً على تعاونكم,
مع تحيات,
اسم وختم ممرضة المدرسة



מידע אודות שירותי בריאות התלמיד

www.natali.co.il

1-700-504-121

pniot-edu@natali.co.il

ימים א'-ה' 08:30-17:30