

\_\_\_\_\_ التاريخ:

حضرة ولي أمر الطالب(ة)  
تحية وبعد,

## نشرة ارشاد للأهل بعد اعطاء تطعيم حي مضعف ضد الانفلونزا דף מידע להורים אחרי מתן חיסון חי מוחלש נגד שפעת

لقد تلقى ابنكم اليوم تطعيم حي مضعف ضد الانفلونزا عن طريق البخ بالأنف

معظم متلقي التطعيم لا يعانون من أي أعراض جانبية، قد تظهر الأعراض التالية بعد 1-3 أيام من التطعيم.  
الأعراض الموضعية: رشح ، احتقان في الأنف ، نزيف من الأنف، ألم في الحنجرة  
الأعراض العامة هي سخونة، سعال، صداع، آلام العضلات، آلام البطن، القيء، الإسهال، الصغير أثناء التنفس،  
القشعريرة، إرهاق.

رد فعل بالجهاز العصبي: متلازمة الجهاز العصبي (Guillain-Barre, Bell's palsy) نادرة جدا.  
فرط بالحساسية: بضمنها ردة الفعل التحسسي الفوري من نوع انافيلكتي هي ردة فعل نادرة جدا

في حالة حصول ردة فعل يجب إبلاغ ممرضة المدرسة.  
حسب الحاجة بالإمكان التوجه لاستشارة الطبيب (برفقة هذه النشرة) وتبليغه عن تلقي التطعيم.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 9 سنوات والذين لم يتلقوا بالسابق جرعتين على الأقل من تطعيم الأنفلونزا، عليهم  
التوجه الى صندوق المرضى لتلقي جرعة ثانية من لقاح الإنفلونزا، بعد 4 أسابيع على الأقل من تلقي الجرعة  
الأولى ، ومن المفضل استكمال هذه الجرعة بنفس التركيب، مع ذلك يمكن استكمال الجرعة الثانية بأي تركيب  
مسجل ضد الانفلونزا حسب الجيل.

باحترام,  
اسم وختم الممرضة



لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع وزارة الصحة  
<http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/flu/Pages/default.aspx>

מידע אודות שירותי בריאות התלמיד

[www.natali.co.il](http://www.natali.co.il)

1-700-504-121

[pniot-edu@natali.co.il](mailto:pniot-edu@natali.co.il)

ימים א'-ה' 08:30-17:30