

חצרה ולי אר طالب /  
السلام عليكم،

## نشرة ارشاد للأهل قبل اعطاء تطعيم حي مضعف ضد الإنفلونزا דף מידע להורים לפני מתן חיסון חי מוחלש נגד שפעת

في العام الدراسي الحالي، سوف يتلقى ابنكم تطعيم حي مضعف ضد الإنفلونزا عن طريق البخ بالأنف. إن الحصول على تطعيم الإنفلونزا هو أفضل طريقة لحماية ابنكم من الإصابة بالمرض في كل عام، وفي هذا العام بسبب انتشار فيروس الكورونا، فمن المهم بشكل خاص الحصول على تطعيم الإنفلونزا. إن تلقي التطعيم يقلل من الإصابة بمرض الأنفلونزا حتى بين أفراد العائلة البالغين.

### في الحالات التالية عليكم إبلاغ ممرضة المدرسة:

- إذا كان ابنكم يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة 38 وما فوق ، في هذه الحالة قد تقرر الممرضة تأجيل التطعيم إلى موعد آخر.
- إذا حصل لابنكم اعراض جانبية صعبة بعد ان تلقى في الماضي وجبة سابقة من تطعيم الأنفلونزا.
- إذا كان ابنكم يعاني من فرط الحساسية حساسية زائدة للبيض / لبروتين البيض / جنتاميسين / جيلاتين / ارجينين؟
- إذا كان ابنكم يعاني من صفير اثناء التنفس في ال 72 ساعة قبل تلقي التطعيم.
- إذا كان ابنكم يتناول ادوية ستيرويدية او احتاج في السابق الى علاج في العناية المكثفة بسبب الربو
- إذا كان ابنكم يتناول الأسبرين بشكل دائم.
- إذا كان ابنكم يعاني من ضعف في جهاز المناعة.
- إذا كان ابنكم يتناول بال 48 ساعة السابقة ادوية مضادة للفيروسات oseltamivir او zanamivir
- إذا كان ابنكم خضع لعملية زرع قوقعة صناعية للأذن.
- إذا كان ابنكم يعاني من تسرب في سائل العمود الفقري
- إذا كان ابنكم يعاني من وضع صحي الذي ممكن ان يؤدي الى استنشاق افرازات الحلق الى مجرى التنفس، أو يسبب ضعف في قدرة الجهاز التنفسي على التعامل مع الإفرازات.
- إذا كان ابنكم قد تلقى وجبة تطعيم ضد الإنفلونزا في السنة الدراسية الحالية / الرجاء كتابة تاريخ التطعيم: \_\_\_\_\_

### لهذه المعلومات اهمية كبرى بهدف اتخاذ القرار بخصوص اعطاء التطعيم

معظم متلقي التطعيم لا يعانون من أي أعراض جانبية، قد تظهر الأعراض التالية بعد 1-3 أيام من التطعيم. الأعراض الموضعية: رشح ، احتقان في الأنف ، نزيف من الأنف، ألم في الحنجرة  
الأعراض العامة هي سخونة، سعال، صداع، آلام العضلات، آلام البطن، القيء، الإسهال، الصفير أثناء التنفس، القشعريرة، إرهاق.  
رد فعل بالجهاز العصبي: متلازمة الجهاز العصبي (Guillain-Barre, Bell's palsy) نادرة جدا.  
فرط بالحساسية: بضمنها ردة الفعل التحسسي الفوري من نوع انافيلكتي هي ردة فعل نادرة جدا

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 9 سنوات والذين لم يتلقوا بالسابق جرعتين على الأقل من تطعيم الأنفلونزا، عليهم التوجه الى صندوق المرضى لتلقي جرعة ثانية من لقاح الإنفلونزا، بعد 4 أسابيع على الأقل من تلقي الجرعة الأولى، ومن المفضل استكمال هذه الجرعة بنفس التركيب، مع ذلك يمكن استكمال الجرعة الثانية بأي تركيب مسجل ضد الإنفلونزا حسب الجيل.

سيعطى التطعيم في تاريخ \_\_\_\_\_

الرجاء ارسال بطاقة تطعيم ولدكم الى المدرسة حتى تاريخ \_\_\_\_\_

شكرا على تعاونكم،  
باحترام،  
اسم وختم الممرضة

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع وزارة الصحة <http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/flu/Pages/default.aspx>



מידע אודות שירותי בריאות התלמיד

[www.natali.co.il](http://www.natali.co.il)

1-700-504-121

[pniot-edu@natali.co.il](mailto:pniot-edu@natali.co.il)

ימים א'-ה' 08:30-17:30